

貯 法：室温保存  
有効期間：3年

日本標準商品分類番号
872646

皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤  
ベタメタゾンジプロピオン酸エステルゾル  
劇薬

リンデロン®-DPソル  
RINDERON®-DP Sol



## 2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 細菌・真菌・スピロヘータ・ウイルス皮膚感染症及び動物性皮膚疾患（疥癬、けじらみ等）【これらの疾患が増悪するおそれがある。】
- 2.2 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.3 鼓膜に穿孔のある湿疹性外耳道炎【穿孔部位の治癒の遅延及び感染のおそれがある。】
- 2.4 潰瘍（ペーチェット病は除く）、第2度深在性以上の熱傷・凍傷【皮膚の再生が抑制され、治癒が遅延するおそれがある。】

## 3. 組成・性状

### 3.1 組成

販売名	リンデロン-DP ソル
有効成分	Ig 中 ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 0.64mg
添加剤	イソプロパノール、プロピレングリコール、マクロゴール400、カルボキシビニルポリマー、水酸化ナトリウム、トコフェロール

### 3.2 製剤の性状

販売名	リンデロン-DP ソル
性状・剤形	無色透明の粘稠な液である。（ソル）

## 4. 効能・効果

湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症、ビダール苔癬を含む）、乾癬、掌蹠膿疱症、紅皮症、薬疹・中毒疹・虫さされ、痒疹群（蕁麻疹様苔癬、ストロフルス、固定蕁麻疹を含む）、紅斑症（多形滲出性紅斑、ダリエ遠心性環状紅斑、遠心性丘疹性紅斑）、慢性円板状エリテマトーデス、扁平紅色苔癬、毛孔性紅色粒糠疹、特発性色素性紫斑（マヨッキー紫斑、シャンバーグ病、紫斑性色素性苔癬様皮膚炎）、肥厚性瘢痕・ケロイド、肉芽腫症（サルコイドーシス、環状肉芽腫）、悪性リンパ腫（菌状息肉症を含む）、皮膚アミロイドーシス、天疱瘡群（ヘイリー・ヘイリー病を含む）、類天疱瘡（ジューリング疱疹状皮膚炎を含む）、円形脱毛症

## 5. 効能・効果に関する注意

皮膚感染を伴う湿疹・皮膚炎には使用しないことを原則とするが、やむを得ず使用する必要がある場合には、あらかじめ適切な抗菌剤（全身適用）、抗真菌剤による治療を行うか、又はこれらの併用を考慮すること。

## 6. 用法・用量

通常、1日1～数回、適量を塗布する。  
なお、症状により適宜増減する。

## 8. 重要な基本的注意

- 8.1 皮膚萎縮、ステロイド潮紅等の局所的副作用が発現しやすいので、特に顔面、頸、陰部、間擦部位の皮疹への使用には、適応症、症状の程度を十分考慮すること。
- 8.2 大量又は長期にわたる広範囲の使用〔特に密封法（ODT）〕により、副腎皮質ホルモン剤を全身投与した場合と同様な症状があらわれることがあるので、特別な場合を除き長期大量使用や密封法

- （ODT）を極力避けること。[9.5、9.7、9.8、11.1.1 参照]
- 8.3 本剤の使用により症状の改善がみられない場合又は症状の悪化をみる場合は、使用を中止すること。
- 8.4 症状改善後は、速やかに他のより緩和な局所療法に転換すること。

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

### 9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性に対しては使用しないことが望ましい。また、大量又は長期にわたる広範囲の使用を避けること。動物試験（マウス、ウサギ：連日皮下投与）で催奇形作用<sup>1)、2)</sup>が報告されている。[8.2 参照]

### 9.7 小児等

長期・大量使用又は密封法（ODT）は避けること。発育障害<sup>3)</sup>を来すおそれがある。  
また、おむつは密封法（ODT）と同様の作用があるので注意すること。[8.2 参照]

### 9.8 高齢者

大量又は長期にわたる広範囲の密封法（ODT）等の使用に際しては特に注意すること。一般に副作用があらわれやすい。[8.2 参照]

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 11.1 重大な副作用

#### 11.1.1 眼圧亢進、緑内障、後嚢白内障（頻度不明）

眼瞼皮膚への使用に際しては眼圧亢進、緑内障<sup>4)</sup>、白内障を起こすことがある。

大量又は長期にわたる広範囲の使用、密封法（ODT）により、緑内障、後嚢白内障等があらわれることがある。[8.2 参照]

### 11.2 その他の副作用

種類／頻度	5%以上	0.1～5%未満	頻度不明
過敏症			紅斑
皮膚	一過性の刺激感	皮膚乾燥	魚鱗様皮膚変化
皮膚の感染症 <sup>注1)</sup>			細菌感染症（伝染性膿瘍疹、毛囊炎・せつ等）、真菌症（カンジダ症、白癬等）、ウイルス感染症
その他の皮膚症状 <sup>注2)</sup>		ざ瘡様発疹	酒さ様皮膚炎・口唇皮膚炎（ほほ、口唇等に潮紅、丘疹、膿瘍、毛細血管拡張）、ステロイド皮膚（皮膚萎縮、毛細血管拡張、紫斑）、多毛、色素脱失
下垂体・副腎皮質系			下垂体・副腎皮質系機能の抑制 <sup>注3)</sup>

注1) このような症状があらわれた場合には、適切な抗菌剤、抗真菌剤等を併用し、症状が速やかに改善しない場合には、本剤の使用を中止すること。密封法（ODT）の場合に起こりやすい。

注2) 長期連用により、このような症状があらわれた場合にはその使用を差し控え、副腎皮質ホルモンを含有しない薬剤に切り替えること。

注3) 大量又は長期にわたる広範囲の使用、密封法（ODT）により発現した事象。投与中止により急性副腎皮質機能不全に陥る危険性があるため、

投与を中止する際は患者の状態を観察しながら徐々に減量すること。

## 14. 適用上の注意

### 14.1 薬剤交付時の注意

患者に対し以下の点に注意するよう指導すること。

#### 14.1.1 使用時

化粧下、ひげそり後等に使用することのないよう注意すること。

#### 14.1.2 使用部位

眼科用として使用しないこと。

## 15. その他の注意

### 15.1 臨床使用に基づく情報

#### （乾癬の治療）

乾癬患者に長期・大量使用した場合、治療中あるいは治療中止後に乾癬性紅皮症、膿疱性乾癬等がみられたとの報告<sup>5)、6)</sup>がある。

## 16. 薬物動態

### 16.2 吸収

ラットに<sup>3</sup>H-標識ベタメタゾンジプロピオニ酸エステル軟膏・クリームを密封法(ODT)により塗布した場合、24時間後の表皮における塗布量に対する残存率は、角質層の有無により著しく異なり、角質層除去皮膚では9~14%であったのに対して、健常皮膚では90~95%であった<sup>7)</sup>。

### 16.4 代謝

ラットにおいてベタメタゾンジプロピオニ酸エステルは速やかに代謝され、胆汁中及び尿中に未変化体は少なかった。主代謝物として確認されているのは、ベタメタゾン17-プロピオニ酸エステル、ベタメタゾン及びそれぞれの6β位が水酸化されたものの4種類であった<sup>8)</sup>。

### 16.5 排泄

ラットにおいてベタメタゾンジプロピオニ酸エステルは尿中よりも糞中への排泄が主である。これはかなりの部分が胆汁中に排泄されるためである<sup>8)</sup>。

また、塗布量に対する糞中及び尿中の合計排泄率は、角質層除去皮膚の場合、24時間以内に50~64%、72時間以内に85~87%であるが、健常皮膚の場合、24時間以内にわずか1.4~3.5%であった<sup>7)</sup>。

## 17. 臨床成績

### 17.1 有効性及び安全性に関する試験

#### 17.1.1 一般臨床試験

本剤を使用した臨床試験における有効性評価対象例は182例であり、有効率は89.0% (162例) であった<sup>9)</sup>。

表17-1 臨床成績

疾患名	有効例数/有効性評価対象例数	有効率 (%)
湿疹・皮膚炎群 <sup>注</sup>	107/115	93.0
乾癬	33/41	80.5
円形脱毛症	22/26	84.6

注：進行性指掌角皮症、ビダール苔癬を含む集計

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

ステロイドは細胞質に存在する熱ショック蛋白質、抑制蛋白質と複合体を形成したステロイド受容体に結合後核内に移行し、ステロイド反応性の遺伝子を活性化させ、その薬理作用を発揮すると考えられている。また、血管内皮細胞やリンパ球等の細胞膜の障害を抑制するような膜の安定性に関与する作用や、フォスフォリバーゼA<sub>2</sub>と呼ばれる細胞膜リン脂質からロイコトリエンやプロスタグランジンなど種々の炎症惹起物質を誘導する重要な酵素の機能を抑える作用も知られている。

その作用機序としては、単量体のステロイドとその受容体が複合体を形成することで、NFκBやAP-1と呼ばれるサイトカイン産生の誘導や細胞接着分子の発現等を調節している細胞内転写因子

の機能を抑制することで、2量体の受容体と結合した場合、リボコルチシン等の誘導を介して、炎症を制御すると考えられている。免疫抑制作用に関しては、リンパ球に対する直接的な機能抑制、アポトーシスの誘導によると考えられている<sup>10)</sup>。

### 18.2 薬理作用

#### 18.2.1 皮膚血管収縮試験

- (1) 健康成人40例における皮膚蒼白度試験(肉眼的判定)において0.064%ベタメタゾンジプロピオニ酸エステル軟膏・クリームは0.12%ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏・クリームに比べて強い皮膚血管収縮能を示した<sup>11)</sup>。
- (2) 健康成人男性12例を対象とした試験において、0.064%ベタメタゾンジプロピオニ酸エステルゾルは0.064%ベタメタゾンジプロピオニ酸エステルクリームと同程度の皮膚血管収縮能を示した<sup>12)</sup>。

#### 18.2.2 クロトン油耳介皮膚炎抑制作用

マウスの耳介にベタメタゾン吉草酸エステル及びベタメタゾンジプロピオニ酸エステルを含むクロトン油を塗布し、耳介の重量を指標に抗炎症作用を評価した。ベタメタゾン吉草酸エステルの効力を100とした場合に、ベタメタゾンジプロピオニ酸エステルは1回塗布で165、5日間反復塗布で371の効力比を示した<sup>13)</sup>。




図18-1 クロトン油耳介皮膚炎抑制作用

## 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：ベタメタゾンジプロピオニ酸エステル

(Betamethasone Dipropionate) (JAN) [日局]

化学名：9-Fluoro-11 $\beta$ , 17, 21-trihydroxy-16 $\beta$ -methylpregna-1, 4-diene-3, 20-dione 17, 21-dipropanoate

分子式：C<sub>28</sub>H<sub>37</sub>FO<sub>7</sub>


分子量：504.59

性状：白色～微黄白色の結晶性の粉末で、においはない。

アセトン又はクロロホルムに溶けやすく、メタノール又はエタノール(99.5)にやや溶けやすく、水にはほとんど溶けない。

光によって徐々に変化する。

化学構造式：



融点：176~180°C

分配係数：クロロホルム又は酢酸エチルとpH2~10の各pH緩衝液との2層間の平衡状態における分配比を測定した結果、すべてのpH域において水層には分配しない。

## 20. 取扱い上の注意

### 20.1 火気には近づけないこと。

### 20.2 遮光して保存すること。

## 22. 包装

10本 [10g(瓶) × 10]

### 23. 主要文献

〔文献請求番号〕

- 1) 長谷川靖彦ほか:応用薬理. 1974;8:705-720 [197400194]
- 2) 長谷川靖彦ほか:基礎と臨床. 1977;11:1672-1682 [197700245]
- 3) Vermeer, B. J. et al. :Dermatologica. 1974;149:299-304  
[197400151]
- 4) Zugerman, C. et al. :Arch. Dermatol. 1976;112:1326  
[197600145]
- 5) 大滝倫子ほか:皮膚科の臨床. 1975;17:75-84 [197500039]
- 6) 木村秀人ほか:皮膚病診療. 1987;9:449-452 [198700698]
- 7) 山田秀雄ほか:応用薬理. 1981;21:613-620 [198100898]
- 8) 山田秀雄ほか:応用薬理. 1981;21:633-644 [198100900]
- 9) 塩野義製薬集計;須貝哲郎ほか:皮膚. 1984;26:331-339  
[198402297] を含む計4文献
- 10) 片山一朗:アレルギー. 2006;55:1279-1283 [201900450]
- 11) 東禹彦ほか:西日本皮膚科. 1973;35:596-602 [197300270]
- 12) 東禹彦:皮膚. 1984;26:254-258 [198402298]
- 13) Lutsky, B. N. et al. :Arzneim.-Forsch. 1979;29:992-998  
[197900342]

### 24. 文献請求先及び問い合わせ先

塩野義製薬株式会社 医薬情報センター

〒541-0045 大阪市中央区道修町3丁目1番8号

電話 0120-956-734

FAX 06-6202-1541

<http://www.shionogi.co.jp/med/>

### 26. 製造販売業者等

#### 26.1 製造販売元

シオノギファーマ株式会社

大阪府摂津市三島2丁目5番1号

#### 26.2 販売元

塩野義製薬株式会社

大阪市中央区道修町3丁目1番8号

