

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。—

使用上の注意改訂のお知らせ

抗CD20 モノクローナル抗体
リツキシマブ（遺伝子組換え）[リツキシマブ後続1] 製剤

リツキシマブ BS点滴静注 100mg「KHK」 リツキシマブ BS点滴静注 500mg「KHK」

生物由来製品、処方箋医薬品（注意一医師等の処方箋により使用すること）

2021年4月

販売
協和キリン株式会社
東京都千代田区大手町1-9-2

製造販売
サンド株式会社
東京都港区虎ノ門1-23-1

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂内容】下線部_____：変更箇所

| 改訂後 | 改訂前 |
|---|--|
| 9. 特定の背景を有する患者に関する注意 | 9. 特定の背景を有する患者に関する注意 |
| 9.6 授乳婦 治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。 本剤は母乳中に移行することが報告されている ³⁾ 。 | 9.6 授乳婦 治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。 ヒト IgG は母乳中に移行することが知られている。 |

【主要文献】

3) Krysko KM, et al. : Neurol. Neuroimmunol. Neuroinflamm. 2020 ; 7 (1) : e637

【改訂理由】

リツキシマブ製剤の使用上の注意と整合を図るため、「9. 特定の背景を有する患者に関する注意」の項を変更いたしました。

改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報 (DSU) No. 298 に掲載されます。

【問い合わせ先】

協和キリン株式会社 くすり相談窓口

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-9-2

電話 0120-850-150

受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日及び弊社休日を除く)