

「使用上の注意」改訂のお知らせ

2023 年 7 月

高血圧症・狭心症治療薬
持続性 Ca 拮抗薬

日本薬局方 アムロジピンベシル酸塩錠

アムロジピン錠2.5mg「明治」

アムロジピン錠5mg「明治」

アムロジピン錠10mg「明治」

日本薬局方 アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠

アムロジピンOD錠2.5mg「明治」

アムロジピンOD錠5mg「明治」

アムロジピンOD錠10mg「明治」

販 売 元 **Meファルマ株式会社**
東京都中央区京橋 2-4-16

製造販売元 **Meiji Seika ファルマ株式会社**
東京都中央区京橋 2-4-16

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂致しますのでお知らせ申し上げます。

今後のご使用に際しましては、最新の「電子化された添付文書」をご参照賜りますようお願い申し上げます。

I. 改訂内容(該当部分のみ)

改 訂 後			改 訂 前		
10. 相互作用（該当部分のみ）			10. 相互作用（該当部分のみ）		
10.2 併用注意(併用に注意すること)（該当部分のみ）			10.2 併用注意(併用に注意すること)（該当部分のみ）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
CYP3A4 阻害剤 エリスロマイシン ジルチアゼム リトナビル ニルマトレルビル・リ トナビル イトラコナゾール等	エリスロマイシン及 びジルチアゼムとの 併用により、本剤の 血中濃度が上昇した との報告がある。	本剤の代謝が 競合的に阻害 される可能性 が考えられる。	CYP3A4 阻害剤 エリスロマイシン ジルチアゼム リトナビル イトラコナゾール等	エリスロマイシン及 びジルチアゼムとの 併用により、本剤の 血中濃度が上昇した との報告がある。	本剤の代謝が 競合的に阻害 される可能性 が考えられる。

_____：自主改訂による改訂箇所

II. 改訂理由

自主改訂

先発医薬品の電子化された添付文書における自主改訂に基づき改訂しました。

ーお願いー

弊社医薬品にて副作用等臨床上好ましくない事象をご経験の際には、下記問い合わせ先までご連絡の上、調査へのご協力をお願い申し上げます。

<製品に関するお問い合わせ先>

Meiji Seika ファルマ株式会社 くすり相談室（Meファルマ株式会社専用ダイヤル）

フリーダイヤル(0120)261-158 FAX(03)3272-2438

PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)に、最新の電子化された添付文書が掲載されます。また、以下のGS1コードを専用アプリ「添付ナビ」で読み取ることで最新の電子化された添付文書等をご参照いただけます。

