

・・・医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。・・・

2023年2月

「禁忌」及び 使用上の注意改訂のお知らせ

武田テバ薬品株式会社 大阪市中央区道修町四丁目1番1号

睡眠剤

ユーロジン®1mg 錠 ユーロジン®2mg 錠 ユーロジン® 散 1%

(一般名:エスタゾラム)

この度、標記製品の「禁忌」及び「使用上の注意」を以下のとおり改訂致しましたのでご案内申し上げます。 今後のご使用に際しましては、電子化された添付文書(以下、電子添文)をご参照下さいますようお願い申し 上げます。

1. 改訂內容(抜粋) (追記箇所 下線:

【禁忌】(次の患者には投与しないこと)

- (1) 重症筋無力症の患者[本剤の筋弛緩作用により、症状が悪化するおそれがある。]
- (2) リトナビル(HIVプロテアーゼ阻害剤)、ニルマトレルビル・ リトナビルを投与中の患者(「相互作用」の項参照)
- 3. 相互作用

(1) 併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
リトナビル	過度の鎮静や呼吸抑	チトクロームP450
ノービア°	制等が起こる可能性	に対する競合的阻
<u>ニルマトレルビ</u>	がある。	害により、本剤の
<u>ル・リトナビル</u>		血中濃度が大幅に
パキロビッド®		上昇することが予
		測されている。

- 【禁忌】(次の患者には投与しないこと)
- (1)重症筋無力症の患者[本剤の筋弛緩作用により、症状が悪化するおそれがある。]
- (2) リトナビル (HIVプロテアーゼ阻害剤) を投与中の患者 (「相 互作用」の項参照)

3. 相互作用

(1) 併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
リトナビル	過度の鎮静や呼吸抑	チトクロームP450
ノービア®	制等が起こる可能性	に対する競合的阻
	がある。	害により、本剤の
		血中濃度が大幅に
		上昇することが予
		測されている。

2. 改訂理由

「禁忌」及び「相互作用:併用禁忌」の項に「ニルマトレルビル・リトナビル」を追記(自主改訂)

相手薬であるニルマトレルビル・リトナビル (パキロビッドパック、ファイザー株式会社) の電子添文において、エスタゾラムとの併用は禁忌とされているため、本剤においても整合を取り「禁忌」及び「相互作用:併用禁忌」の項にニルマトレルビル・リトナビルを追記しました。

- 武田テバDIセンター 0120-923-093 受付時間 9:00~17:30(土日祝日・弊社休業日を除く)
- 医療関係者向けホームページ https://www.med.takeda-teva.com

本改訂につきましては、医薬品安全対策情報(Drug Safety Update)No.315(2023 年 3 月発行)に掲載される予定です。最新の電子添文は医薬品医療機器総合機構ホームページ(http://www.pmda.go.jp/)に掲載されます。また、専用アプリ「添文ナビ」より GS1 バーコードを読み取る事で、最新の電子添文等をご参照いただけます。



(ユーロジン散) (01)14987123079676