

処方箋医薬品

オキシトシン製剤
日本薬局方 オキシトシン注射液

アトニン®注1単位
アトニン®注5単位

－ 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

「使用上の注意」改訂のお知らせ

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。
本剤のご使用に際しましては、下記の改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。
改訂内容につきましては、医薬品安全対策情報（DSU）No.342に掲載される予定です。

2026年1月

あすか製薬株式会社

改訂内容（ ：改訂箇所）

改訂後	改訂前
<p>1. 警告 〈分娩誘発、微弱陣痛〉 1.1 過強陣痛や強直性子宮収縮により、胎児機能不全、子宮破裂、頸管裂傷、羊水塞栓等が起こることがあり、母体あるいは児が重篤な転帰に至った症例が報告されているので、無痛分娩時を含め、本剤の投与にあたっては以下の事項を遵守し慎重に行うこと。 [11.1.2、11.1.3参照] 1.1.1～1.1.6 省略 〈効能共通〉 1.2 省略</p>	<p>1. 警告 〈分娩誘発、微弱陣痛〉 1.1 過強陣痛や強直性子宮収縮により、胎児機能不全、子宮破裂、頸管裂傷、羊水塞栓等が起こることがあり、母体あるいは児が重篤な転帰に至った症例が報告されているので、本剤の投与にあたっては以下の事項を遵守し慎重に行うこと。[11.1.2、11.1.3参照] 1.1.1～1.1.6 省略 〈効能共通〉 1.2 省略</p>

以上

～最新の電子添文はこちらから～

アトニン®注1単位
アトニン®注5単位

(01)04987123502924

