

ビーリンサイト®点滴静注用35 μ g 適正使用のお願い

デキサメタゾン前投与について

2025年10月
アムジェン株式会社（製造販売）
アステラス製薬株式会社（発売）

ビーリンサイト点滴静注用35 μ g（以下、本剤）につきましては、2018年11月27日の販売開始後より一般使用成績調査（全例調査）を実施しておりました。本調査で収集した400例の集計結果において、サイトカイン放出症候群の発現を軽減するために使用されるデキサメタゾン等の副腎皮質ホルモン剤の前投与が、全体の9.5%（38/400例）で確認できませんでした。

このことから、本剤をより安全に使用いただくために、改めて本剤投与前及び増量前のデキサメタゾン投与の確実な実施をお願いさせていただくことといたしました。

つきましては、以下の点にご留意ください。

7. 用法及び用量に関連する注意

7.1 本剤投与によりサイトカイン放出症候群が発現する可能性があるため、本剤投与前及び増量前はデキサメタゾンを投与すること。

<電子化された添付文書（2025年4月改訂、第3版）抜粋>

本剤の使用に際しましては、最新の電子化された添付文書および適正使用ガイドをご参照の上、適正使用にご留意いただくとともに、有害事象があらわれた場合には速やかにご報告をいただきますようお願い申し上げます。

電子添文および適正使用ガイドは、PMDAホームページ「医薬品に関する情報」（<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>）、「アムジェンホームページ」（<https://www.amgen.co.jp/>）及び「アステラス製薬ホームページ— Astellas Medical Net」（<https://amn.astellas.jp/>）でご確認いただけます。あるいは、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ®」を用いて、以下のGS1バーコードを読み取ることによりご覧いただけます。

電子化された添付文書の参照先：GS1（販売単位）



(01)14987233105791

【お問い合わせ先】

アムジェン株式会社 メディカルインフォメーションセンター
フリーダイヤル 0120-790-549
受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:30（土日・祝日・会社休日を除く）

アステラス製薬株式会社 メディカルインフォメーションセンター
フリーダイヤル 0120-189-371
受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:30（祝日・会社休日を除く）

BLC255002AM1
BLC37001A01