

カリメート[®]ドライシロップ92.59%

販売中止のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、「カリメートドライシロップ92.59%」につきまして、諸般の事情により、弊社在庫がなくなり次第販売を中止させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。

ご迷惑をおかけすることになり誠に恐縮に存じますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

なお、本製品は2026年4月に経過措置品目へ移行し、2027年3月末日をもちまして経過措置期間満了となる予定です。






謹白

■販売中止品目／弊社在庫終了予定時期／経過措置期間満了予定日

販売名	包装	統一商品コード	薬価基準収載 医薬品コード	弊社在庫終了 予定時期	経過措置期間 満了予定日
カリメート ドライシロップ 92.59%	5.4g×126包	770558503	2190016R2021	2026年5月頃	2027年3月末日

※在庫終了予定時期は販売状況により前後する場合がございます。

■代替品

販売名	包装	統一商品コード	販売包装単位 コード	調剤包装単位 コード	HOT番号	レセプト電算処理 システム用コード
カリメート 経口液20% (ノンフレーバー)	25g×100包	770575401	 (01)14987770575408	 (01)04987770575432	1214000010301	622140001
	25g×105包	770575500	 (01)14987770575507		1214000010302	
カリメート 経口液20% (オレンジフレーバー)	25g×100包	770511706	 (01)14987770511703	 (01)04987770511737	1214000010401	
	25g×105包	770511805	 (01)14987770511802		1214000010402	
カリメート 経口液20% (アップルフレーバー)	25g×100包	770523204	 (01)14987770523201	 (01)04987770523211	1214000010501	
	25g×105包	770523303	 (01)14987770523300		1214000010502	
カリメート散	5g×126包	770565105	 (01)14987770565102	 (01)04987770565112	1035698070202	620003443

※当該代替品への切替は、販売中止品の在庫終了後にご検討いただければ幸甚に存じます。

裏面もご覧ください▶▶▶

興和株式会社

東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

<問い合わせ> 弊社MRまたはくすり相談センター <TEL> 0120-508-514(受付時間9:00~17:00 土・日・祝日・弊社休日を除く)

「カリメートドライシロップ92.59%」と「カリメート経口液20%」・「カリメート散」の比較

	販売中止品	代替品	
販 売 名	カリメート ドライシロップ92.59%	カリメート 経口液20%	カリメート 散
有効成分	1g中 日局ポリスチレンスルホン酸 カルシウム 925.9mg	25.0g中 日局ポリスチレンスルホン酸 カルシウム 5.0g	1g中 日局ポリスチレンスルホン酸 カルシウム 1g
添 加 剤	カルメロース Na、アスパル テーム (L-フェニルアラニン 化合物)、メチルセルロース、 ヒドロキシプロピルセルロース	キサンタンガム、ローカスト ビーンガム、カラギーナン、 メチルセルロース、粉末還元 麦芽糖水アメ、スクラロース、 ソルビン酸、クエン酸Na水和 物、クエン酸水和物、(オレ ンジ・アップル)香料	
効能又は効果	急性及び慢性腎不全に伴う高カリウム血症		
用法及び用量	通常成人1日16.2～32.4g(ポリ スチレンスルホン酸カルシウム として1日15～30g)を2～3回 に分け、その1回量を水30～ 50mLに懸濁し、経口投与す る。なお、症状により適宜増減 する。	通常成人1日75～150g(ポリ スチレンスルホン酸カルシウム として1日15～30g)を2～3回 に分け、経口投与する。なお、 症状により適宜増減する。	〈経口投与〉 通常成人1日15～30gを2～ 3回に分け、その1回量を水 30～50mLに懸濁し、経口投与 する。なお、症状により適宜 増減する。 〈注腸投与〉 通常成人1回30gを水または 2%メチルセルロース溶液 100mLに懸濁して注腸する。 体温程度に加温した懸濁液を 注腸し30分から1時間腸管内 に放置する。液がもれてくる ようであれば枕で臀部挙上 するか、或いはしばらくの間 膝胸位をとらせる。 水または2%メチルセルロース 溶液にかえて5%ブドウ糖溶液 を用いてもよい。
薬 価	92.59%1g 9.60円	20%25g1包 77.80円	1g 9.30円
包 装	5.4g×126包	25g×100包、25g×105包	5g×126包