

2023 年 7 月

経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤

フルルビプロフェン製剤

アドフィード[®]パップ40mg

ライナー変更のお知らせ（7 枚×20、7 枚×50 包装）

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

弊社製品につきましては、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、従前よりご愛用いただいております経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤 フルルビプロフェン製剤
アドフィードパップ40mgにつきまして、下記のとおり変更いたしましたのでご案内申し上げます。

今回は包装仕様の変更で、製剤の組成・性状等につきましては従前と変わりません。

当分の間、新旧製品が市場に流通し、何かとご迷惑をおかけいたしますが、ご寛容賜りより一層のご愛用をいただきますようお願い申し上げます。

謹白


記

■ 変更内容


- ・ ライナーの仕様変更 （ハーフカット、デザイン）
- ・ 薬袋の裏面の使用方法を変更 （次頁参照）

〈 ライナー面 〉

【 変 更 前 】



【 変 更 後 】



ハーフカットライナーに変更
⇒左右にひっぱるとフィルムがはがれます



科研製薬株式会社

【お問い合わせ先】 〒113-8650 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
医薬品情報サービス室 ☎ 0120-519-874

OS-0390

〈 薬袋裏面 〉


【 変 更 前 】

【 変 更 後 】

～希2025(希通にら附付)6-27(Y42)6409 C3373-1C312

使用方法

- 透明フィルムをはがして、患部にはってください。



中心の切れ目から、のフィルムをはがし、患部に貼ります。

のフィルムをはがしながら患部に密着させます。

- 伸縮性の布を使用していますので、少しのばしながら患部にはってください。
- 患部が汗などでぬれている場合は、よくふきとってから使用してください。

注 意

- 傷口、粘膜、湿疹または発疹のある部位には使用しないでください。
- かぶれ、かゆみなどの症状があらわれた場合には、使用を中止して、医師または薬剤師に相談してください。
- 本剤で過敏症を起こしたことのある方、アスピリンぜん息の経験のある方は使用しないでください。
- 気管支ぜん息の経験のある方は、医師に相談してください。
- 処方された患者さん以外は、お使いにならないようお願いいたします。

保管上の注意

- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 開封後はチャックを閉めて保管してください。
- 直射日光や高温の場所をさけて保管してください。

識別コード KC-321


ADDFEED PAP40mg



～希2025(希通にら附付)6-27(Y42)6409 C3373-1C312

使用方法

- 透明フィルムをはがして、患部にはってください。



透明フィルムを左右にひっぱり貼付面を患部に貼ります。

フィルムをはがしながら患部に密着させます。

- 伸縮性の布を使用していますので、少しのばしながら患部にはってください。
- 患部が汗などでぬれている場合は、よくふきとってから使用してください。

注 意

- 傷口、粘膜、湿疹または発疹のある部位には使用しないでください。
- かぶれ、かゆみなどの症状があらわれた場合には、使用を中止して、医師または薬剤師に相談してください。
- 本剤で過敏症を起こしたことのある方、アスピリンぜん息の経験のある方は使用しないでください。
- 気管支ぜん息の経験のある方は、医師に相談してください。
- 処方された患者さん以外は、お使いにならないようお願いいたします。

保管上の注意

- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 開封後はチャックを閉めて保管してください。
- 直射日光や高温の場所をさけて保管してください。

識別コード KC-321

ADDFEED PAP40mg

■ 【変更開始製造番号・出荷予定時期】

品 名	包 装	変更開始製造番号 (使用期限)	変更品 出荷予定時期
アドフィードパップ 40mg	140 枚(7 枚×20)	H103G (2026 年 7 月)	2023 年 9 月
	350 枚(7 枚×50)	G153G (2026 年 6 月)	2023 年 9 月

- * 出荷予定時期は需給状況により若干のずれが生じることもあります
- * しばらくの間、外箱、内箱に「ライナー変更品」表示をいたします
- * 6 枚入り包装は、ライナー変更ありません

以上