


1. 内容

患者のニーズに対応するために通常とは異なる調剤方法を行う際、口頭指示などでは過誤リスクが増大するため、処方内に指示内容を記載することで指示を明確にし、調剤過誤を防止する。

調剤指示追加に対し、薬剤師はその指示内容を処方箋内に記載するとともに、電子カルテの代行入力オーダーにより指示内容を追加し、かつ追加理由について記載する。医師は追加理由を確認し、薬剤師の代行入力に対する承認を行う。

また、院外処方から入院処方に Do 処方した場合、院内調製品を利用できる場合は薬剤師が電子カルテの代行入力オーダーにより処方変更を行い、かつ変更理由について記載する。医師は変更理由を確認し、薬剤師の代行入力に対する承認を行う。

2. 実施の流れ



<例 1>

賦形なしで粉砕してください

Rp. (粉砕) ナイキサン錠 100mg 1回1錠 1日2回 朝夕食後 30日分
ファモチジン散 10%「サワイ」 1回10mg



Rp. (粉砕) ナイキサン錠 100mg 1回1錠 1日2回 朝夕食後 30日分
乳糖賦形不可
ファモチジン散 10%「サワイ」 1回10mg 1日2回 朝夕食後 30日分
乳糖賦形不可

<例 2>

矯味はオレンジ味のみ

Rp. エレンタール配合内用剤 1回1包 1日3回 朝昼夕食後 30日分



Rp. エレンタール配合内用剤 1回1包 1日3回 朝昼夕食後 30日分
オレンジフレーバーを添付

<例 3>

練合してください

Rp. アンテベート軟膏 0.05% 5g 50g 1日2回 発赤部塗布
ヘパリン類似物質クリーム 0.3%「日医工」 50g 7日分に相当



Rp. アンテベート軟膏 0.05% 5g 50g 1日2回 発赤部塗布
ヘパリン類似物質クリーム 0.3%「日医工」 50g ★混合 7日分に相当

<例 4>

Rp. アンテベート軟膏 0.05% 5g 25g 1日2回 発赤部塗布
プロペト 25g 7日分に相当



Rp. アンテベート軟膏：プロペト＝1：1(50g) 1個 1日2回 発赤部塗布
7日分に相当