

1. 内容


①錠剤不均等投与は、用量入力時の不均等投与指示を行うことで薬剤部門システムに反映される。一方、フリーコメントで入力された不均等投与は薬剤部門システムに反映されないため、一包化などで不具合が発生し服薬過誤の原因になる可能性がある。

フリーコメントで入力された不均等投与に対し、薬剤師は電子カルテの代行入力オーダーにより適正な不均等投与指示へ変更し、かつ変更理由について記載する。医師は変更理由及び変更内容を確認し、薬剤師の代行入力に対する承認を行う。

②用法コメントで入力された服用日は服用カレンダー機能に反映される。一方、フリーコメントで入力された服用日は服用カレンダー機能に反映されないため、病棟において服薬過誤の原因になる可能性がある。

フリーコメントで入力された服用日に対し、薬剤師は電子カルテの代行入力オーダーにより用法コメントに変更を行い、かつ変更理由について記載する。医師は変更理由及び変更内容を確認し、薬剤師の代行入力に対する承認を行う。

2. 実施の流れ



<例 1>

Rp. プレドニン錠 5mg 1回10錠 1日1回 朝食後 4日分
朝7錠 昼3錠で服用してください



Rp. プレドニン錠 5mg 1日2回 朝昼食後 4日分
【0 - 7 - 3 - 0 - 0 で服用】

フリーコメントで入力

<例 2>

Rp. ダイフェン配合錠 1回1錠 1日1回 月水金 朝食後 3日分

	3月1日 (月)	3月2日 (火)	3月3日 (水)	3月4日 (木)	3月5日 (金)	3月6日 (土)
ダイフェン配合錠 1錠	○	○	○			

処方カレンダーに反映されないため 投与過誤のリスクが発生する



用法コメント

Rp. ダイフェン配合錠 1回1錠 1日1回 朝食後 3日分
月・水・金曜日に服用

	3月1日 (月)	3月2日 (火)	3月3日 (水)	3月4日 (木)	3月5日 (金)	3月6日 (土)
ダイフェン配合錠 1錠	○		○		○	